

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS

# TACORA 25 EW

FUNGICIDA - TRIAZOL  
TEBUCONAZOLE

## PRECAUCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE  
DENSIDAD A 20°C: 0,97 g/mL

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O  
SE INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL  
POR EXPOSICIÓN

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN  
MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES,  
ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO  
MODO DE ACCIÓN:

TACORA 25 EW es un fungicida que actúa en forma sistémica, preventiva, curativa y erradicante sobre hongos.

### EQUIPO DE APLICACIÓN:

Este producto puede aplicarse con aspersora de mochila, mediante maquinaria como tractor o vía aérea, mediante aspersión sin boquilla. Asegúrese que su equipo de aplicación se encuentre debidamente calibrado. Se recomienda la utilización de boquillas de cono. El equipo y los utensilios empleados en mezcla y aplicación del producto deben ser lavados con suficiente agua después de cada jornada de trabajo. Deseche las aguas de lavado en un hueco lejos de fuentes de agua. Debe usar el equipo de protección durante el lavado del equipo de aplicación. No presenta ningún tipo de acción perjudicial sobre el equipo de aplicación.



### FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Medir la dosis requerida de TACORA 25 EW y luego agregar al estanque del equipo aplicador con agua hasta la mitad y el agitador en marcha. Terminar de llenar el estanque y aplicar la mezcla siempre con el agitador en funcionamiento, para mantener una emulsión homogénea.

### Aplicaciones aéreas:

Agregue la cantidad de agua requerida en el tanque de aplicación con el agitador en marcha, luego agregue el emulsificante adherente y posteriormente la dosis requerida de TACORA 25 EW, manteniendo siempre el agitador en marcha, agite por algunos minutos. Durante la manipulación y aplicación del producto asegúrese de utilizar el equipo de protección personal adecuado que corresponde a anteojos protectores, mascarilla, guantes, botas de hule, dosificador y aplicador.



### RECOMENDACIONES DE USO:

Cultivo	Plaga	Dosis
Banano y Plátano <i>Musa spp</i>	Sigatoka negra <i>Mycosphaerella fijensis</i>	0,4 L/ha
Maní <i>Arachis hipogea</i>	Roya <i>Puccinia arachidis</i> <i>Cercospora sp.</i>	0,5 L/ha
Papa <i>Solanum spp</i>	Tizón temprano <i>Alternaria solani</i>	0,5 L/ha
Tomate <i>Lycopersicon esculentum</i>	Tizón temprano <i>Alternaria solani</i>	0,5 L/ha
Arroz <i>Oryza sativa</i>	Quemazón <i>Pyricularia oryzae</i> <i>Cercospora oryzae</i>	0,5 L/ha
Cebolla <i>Allium cepa</i> Ajo <i>Allium sativum</i>	Argeño <i>Alternaria porrii</i> Moho gris <i>Botrytis spp</i> Podredumbre <i>Sclerotium spp.</i> Tizón <i>Fusarium sp.</i>	0,5 L/ha
Plantas ornamentales	Roya de clavel <i>Uromices Dianthi</i> Oidium del rosál <i>Sphaerotheca spp</i> Mancha negra del rosál <i>Diplocarpon rosea</i> Roya del rosál <i>Phragmidium mucronatum</i>	0,5 L/ha

### INTERVALO DE APLICACIÓN

Realizar muestreo de enfermedades y dependiendo del mismo se harán las aplicaciones. Se recomienda utilizar 280 litros de agua por hectárea a una presión de 40 PSI.

### INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

Cero días para banano, plátano y ornamentales. 14 días para los otros cultivos mencionados en el cuadro de usos.

**INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:** Para bananos y plátanos sin restricción en reingreso al área tratada. Para el resto de los cultivos mencionados en el cuadro de usos se debe esperar a que la nube de aplicación se encuentre seca sobre el cultivo tratado.

**FITOTOXICIDAD:** No presenta efectos fitotóxicos en cultivos y dosis indicadas si se siguen fielmente las instrucciones de etiqueta y panfleto, no es compatible con piretroides en formulaciones de emulsión concentrada.

**COMPATIBILIDAD:** Evitar mezclas con productos del tipo piretroide en formulación emulsión concentrada. En caso de duda respecto a la compatibilidad del producto, efectuar pruebas en pequeña escala antes de aplicar.

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

#### ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

No transporte este producto con alimentos, semillas, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico. Almacene bajo llave en un lugar fresco, seco y aireado, alejado del calor y de llamas, lejos del alcance de niños, personas discapacitadas, y animales domésticos. Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. No deje envases sin cerrar.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.	
NO COMER, FUMAR, O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA	

### SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Irritación ocular y dermal. Irritación de las vías respiratorias. Si se ingiere causa irritación.

### PRIMEROS AUXILIOS:

**POR INGESTIÓN:** Administre una taza de agua sólo si el afectado está consciente, no provoque el vómito debido a riesgos respiratorios. Obtenga atención médica.

**POR INHALACIÓN:** Retire a la persona afectada del área contaminada a un área de mayor ventilación y manténgala en reposo. Si es necesario administre respiración artificial. Obtenga atención médica.

**POR CONTACTO CON LOS OJOS:** Lave inmediatamente con agua durante por lo menos 10 minutos, cuidando que los párpados estén abiertos.

**POR CONTACTO CON LA PIEL:** Quite la ropa y zapatos contaminados; lave la zona afectada con abundante agua fría y jabón.

**NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.**

### ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:

No tiene antídoto específico. El tratamiento médico es sintomático y de soporte. En caso de intoxicación notificar al Ministerio de Salud.

### CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

<b>Guatemala:</b> Centro de Información y Asesoría Toxicológica.....	2232-0735 y 2251-3560
<b>Belize:</b> Karl Heusner Memorial Hospital.....	231-548 y 231-639
<b>El Salvador:</b> "Centro Nacional de Información Toxicológica Hospital San Rafael, Santa Tecla....."	2525-5800 Ext. 148 y 149
<b>Honduras:</b> Secretaría de Agricultura y Ganadería, Sanidad Vegetal.....	232-6213 y 235-8424
<b>Nicaragua:</b> Centro de Toxicología Complejo de Salud "Concepción Palacios".....	289-7150/54 ext. 213
<b>Costa Rica:</b> Centro Nacional para el Control de las Intoxicaciones.....	223-1028
<b>Panamá:</b> Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos.....	269-2741
<b>República Dominicana:</b> Hospital Dr. Luis Aybar.....	648-3478 y 684-3672
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello.....	681-2913 y 681-6922

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**  
TÓXICO PARA PECES Y/O CRUSTÁCEOS  
NO CONTAMIE RÍOS, O LAGOS Y ESTANQUES O FUENTES DE AGUA  
CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.



### MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

**APROVECHE EL CONTENIDO COMPLETO DEL ENVASE, CUANDO LO VACÍE, LAVE Y ENJUAGUE TRES VECES CON AGUA LIMPIA Y AGREGUE EL RESULTADO DEL ENJUAGUE A LA MEZCLA YA PREPARADA**

Intilice los envases vacíos, perfórelos y elimínelos según legislación local vigente

**EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DESENADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE**

**AVISO DE GARANTÍA:** El formulador y el registrante garantizan la calidad del producto en su envase original y cerrado herméticamente. También garantiza la eficacia del producto, siempre y cuando se le de el uso estipulado en el panfleto. Debido a que esta fuera de nuestro alcance el control sobre el almacenamiento, manipuleo de este producto, nos es imposible asumir responsabilidades por posibles daños que puedan ocasionarse debido a estos factores. Se garantiza asimismo la composición química del producto tal y como se indica en la etiqueta, siempre y cuando el envase se encuentre sellado.

### FORMULADO POR:



AGRÍCOLA NACIONAL S.A.C.e.I.  
Almirante Pastene 300, Santiago Chile  
Tel: 562-4706800 Fax: 562 - 2358634

PAÍS  
GUATEMALA

NÚMERO DE REGISTRO  
894-6

FECHA DE REGISTRO  
14 de Junio 2013