

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y  
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRICOLAS



## YUNKE 25.7 SC

INSECTICIDA – FENIL PIRAZOL + NEONICOTINOIDE  
FIPRONIL + IMIDACLOPRID



**DAÑINO**

**ANTIDOTO: NO TIENE**

**DENSIDAD: 1.13- 1.15 g/ml a 20 °C**

**ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O  
SE INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA  
PIEL POR EXPOSICION**

**“NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACION”**

**“MANTENGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS. PERSONAS  
MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMESTICOS,  
ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS”**

### USO AGRONOMICO

**MODO DE ACCION: YUNKE 25,7 SC** combina la actividad de fipronil, insecticida que posee acción de amplio espectro, tóxico por ingestión y contacto, de excelente control residual, con la actividad de imidacloprid, que es un insecticida con actividad translaminar y de acción estomacal y de contacto.

**EQUIPO DE APLICACION:** Puede aplicarse con equipo terrestre, aspersora de mochila o equipo accionado por tractor, con un volumen de agua de 200L/ha. Debe asegurarse que los equipos y boquillas estén en buen estado y calibrados para una buena distribución y tamaño de la gota uniforme. Antes de aplicar **YUNKE 25.7 SC** calibre con agua el equipo de aspersión para verificar que está aplicando la dosis correcta. Después de la aplicación, lave el equipo de aspersión, deje secarlo y guárdelo. Utilice el equipo de protección personal, antes de usar y manipular este producto.



**FORMA DE PREPARACION DE LA MEZCLA:** Medir la dosis requerida de **YUNKE 25,7 SC** y diluir previamente en un balde con agua, luego agregar al estanque del equipo aplicador con agua hasta la mitad y el agitador en marcha. Terminar de llenar el estanque y aplicar la mezcla siempre con el agitador en funcionamiento. Al finalizar la aplicación, lavar el equipo prolijamente para evitar contaminar otros cultivos con los residuos.



### RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	PLAGA A CONTROLAR	DOSIS (lts/ha)
ARROZ ( <i>Oryza sativa L.</i> )	Mosca minadora ( <i>Hydrellia whirti</i> )	0.30
PAPA ( <i>Solanum tuberosum</i> )	Gusano blanco de la Papa ( <i>Premnotypes vorax</i> )	0.75

Para papa aplicar en el momento de máxima geminación, a la desyerba y al aporque bajo un programa de Manejo Integrado de plagas.

Para Arroz aplicar a presencia de primeros daños con umbral de daño económico.

**INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y COSECHA:** Arroz: 45 días; Papa: 6 días

**INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA:** 12 HORAS Después que el rocío de la aplicación se haya secado, de lo contrario se debe utilizar el equipo de protección completo.

**FITOTOXICIDAD:** No presenta en los cultivos para los cuales se recomienda, si se siguen las instrucciones de la etiqueta.

**COMPATIBILIDAD:** Es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común. En caso de duda con respecto a la compatibilidad del producto realizar pruebas en pequeña escala antes de aplicar.

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA DE USO:** Los usuarios deben lavarse bien las manos antes de comer, beber, mascar chicle, fumar o ir al baño. Lavar abundantemente después de usar. No trabajar en la neblina del líquido o con viento. Para la mezcla, aplicación del producto y lavado de equipo de aplicación, use la ropa de protección: sombrero, protector de ojos, mascarilla, camisa manga larga y pantalón largo, guantes y botas de hule. El filtro de la mascarilla debe cambiarse a menudo. Evitar el contacto directo con el producto. Evite aspirar la llovizna de aspersión. Bañarse con eficiente agua y jabón después de la jornada de trabajo y póngase ropa limpia. Use ropa limpia en cada jornada de trabajo. No lave la ropa de trabajo y equipo de protección junto con la ropa de uso normal.

**ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:** Almacene y transporte el producto en lugares frescos secos y aireados, lejos de alimentos, forrajes y medicinas. Manténgalo en su envase original, cerrado herméticamente y etiquetado. No es inflamable, no es explosivo, resistente a la oxidación y la luz, no es corrosivo.

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN**

**MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACION DE ESTE PRODUCTO.**

**BAÑESE DESPUES DE TRABAJAR Y PONGASE ROPA LIMPIA.**



**SINTOMAS DE INTOXICACION:** Si es ingerido puede causar lesiones en el sistema digestivo, irritación en piel y ojos.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

**INGESTION:** NO Provoque el vómito si es ingerido. No suministre líquido a una persona inconsciente. Busque atención médica.

**INHALACION:** Retire el paciente a un lugar ventilado, seco y aireado. Afloje las prendas de vestir y vigile la respiración.

**CONTACTO CON LOS OJOS:** Enjuague abundante agua y jabón durante un tiempo mínimo de 15 minutos.

**CONTACTO CON LA PIEL:** quite las prendas de vestir y lave la parte afectada con abundante agua y jabón.

**NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VOMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA**

**ANTIDOTO Y TRATAMIENTO MEDICO:** No tiene antídoto específico. Seguir tratamiento sintomático y de soporte.

**CENTRO NACIONALES DE INTOXICACION:**

Guatemala: Centro de Información Asistencia y Toxicológica (502) 2232-0735

Belice: Centro de Intoxicaciones Karl Heusner Memorial Hospital (501) 230-778

El Salvador: Centro Nacional de Información Toxicológica (503) 2288-0417

Honduras: Hospital Escuela (504) 2232-2223

**MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE:**

**NO CONTAMINE RIOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES Y EMPAQUES VACIOS**

**MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:** En caso de derrames, recójalos con aserrín o suelo y entiérrelos. Los envases vacíos lávelos tres veces con agua y llévelos al centro de acopio más cercano, de lo contrario destrúyalos perforándolos y enterrándolos a no menos de 40 cm de profundidad, lejos de fuentes de agua y casas de habitación.

**EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE**

**AVISO DE GARANTIA:** La Compañía fabricante y el registrante, así como el distribuidor garantizan el contenido de este envase, siempre que se encuentre en su envase original bien cerrado y con el sello de garantía inalterado, debido a esto nos vemos imposibilitados de controlar aspectos importantes en el transporte, almacenamiento y uso de este producto, no asumimos responsabilidad por posible daños por ellos. Solo garantizamos el contenido inalterable del producto de acuerdo a lo estipulado en la etiqueta y el uso recomendado en el panfleto. El consumidor adquiere el producto con pleno conocimiento de ello.

**FORMULADO POR:**

**AGRÍCOLA NACIONAL, S.A.C. e I.**

Almirante Pastene 300 – Santiago Chile

Tel: 56-2-4869000 Fax: 56-2-4869100

**IMPORTADO POR:**

PAIS	N° DE REGISTRO	FECHA REGISTRO
Guatemala	894-28A	21 de Agosto 2014

**N° lote**

**Fecha de Formulación**

**Fecha de Vencimiento**